



# Fertiprado®

PASTAGENS E FORRAGENS



## Fertifeno



**FERTIPRADO - SEMENTES E NUTRIENTES, LDA**

Herdade dos Esquerdos  
7450-250 Vaiamonte

Portugal

tel 245 569 000

fax 245 569 103

e-mail [fertiprado@fertiprado.com](mailto:fertiprado@fertiprado.com)

 [fertiprado](#)  [fertiprado](#)  [fertiprado](#)

[www.fertiprado.com](http://www.fertiprado.com)

Todas as sementes fornecidas pela Fertiprado® são certificadas por entidades oficiais, o que garante sua qualidade germinativa e de pureza genética. Todas as misturas são certificadas UE, o que garante sua qualidade e composição. Todas as informações técnicas são fornecidas de acordo com nosso melhor conhecimento e compreensão, resultante de muitos anos de experiência, ensaios conforme metodologia científica e estudo bibliográfico contínuo, mas NÃO são garantia de resultados. Apesar do cuidado tomado, não podemos garantir que as informações técnicas sejam repetíveis/completas na prática agrícola em cada caso concreto face a diversos condicionantes que podem ocorrer, resultem eles de ação ou omissão humana ou da natureza. A Fertiprado® exclui responsabilidade por danos ou reivindicações de danos resultantes do uso dos seus produtos. Sujeito a alteração sem aviso prévio.

## MISTURA BIODIVERSA DE SEMENTES DE AZEVÉNS, ERVILHACA E TREVOS ANUAIS

Máxima produção & qualidade num corte único

**CARACTERÍSTICAS**

- Constituída por variedades tardias (de ciclo longo)
- O potencial produtivo é revelado na Primavera
- Concentração da produção no final do ciclo

**RAZÕES PARA SEMEAR**

- Excelente digestibilidade – aumento da capacidade de ingestão dos animais
- Solução ideal para parcelas onde os animais não podem entrar para pastar
- Alto valor proteico – ideal para produções mais intensivas



**Época ideal de Sementeira** Setembro > Novembro

**Densidade de Sementeira (Kg/ha)** 35 - 45

**Preparação do Terreno** Terra bem desfeita e plana. Profundidade aconselhada de 10 cm (não fofa).

**Sementeira** Profundidade da semente: 0,5 a 1 cm Rolo dentado, grade de bicos, ou arrojão

**Adubação indicativa de Fundo (unid./ha)** Azoto: 20 a 40 N  
Fósforo: 40 a 90 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
Potássio: 40 a 90 K<sub>2</sub>O

**Adubação indicativa de Cobertura (unid./ha)** Azoto: 30 a 40 N  
Novembro / Fevereiro

(Adubação mediante resultados da análise de solo)

**Qualidade e Produção**

**PB (%)** 15 - 22  
Proteína Bruta

**DMS (%)** 60 - 70  
Digestibilidade da Matéria Seca

**UFL /kg MS** 0,75 - 0,90  
Unidades Forrageiras Leite

**MS (t/ha)** 6 - 14  
Matéria Seca

**GAMA FERTIFENO**

<b>FERTIFENO AC</b>	Solos ácidos a neutros (franco-arenosos a franco-argilosos)
<b>FERTIFENO AR</b>	Solos ácidos a neutros (arenosos ou outros grosseiros)
<b>FERTIFENO NEU</b>	Solos neutros a alcalinos (argilo-calcáreos)
<b>FERTIFENO XL</b>	Ciclo muito longo (regadios ou zonas atlânticas)



**MANEIO DO FERTIFENO**

- O primeiro corte\*, quando o azevém tiver 8 a 9 folhas, permite melhorar a homogeneidade da cultura e fazer o controlo de infestantes melhorando a sua composição florística
- Para uma melhor relação qualidade/quantidade, o corte para feno ou silagem deve ser feito quando 30 a 40% das leguminosas estiverem em floração
- Para uma silagem de alta qualidade, deve ser feita uma pré-fenagem de forma a obter teores de matéria seca entre 30% e 45%

\* Apenas possível em sementeiras precoces e com condições climáticas favoráveis



Para mais informações, **consulte-nos.**

